



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE N° 4/2012 del 18/05/2012

Fase fenologica. nelle varietà precoci (Pinot nero e Chardonnay) è possibile notare l'inizio della fioritura in particolar modo nei vigneti ben esposti alla radiazione solare. I vitigni a maturazione tardiva (Croatina e Barbera) hanno raggiunto la fase di prefioritura. Con l'abbassamento delle temperature medie si potrebbe rallentare lo sviluppo del germoglio e di questa fase.

Peronospora. Solo in alcuni vigneti è comparsa la macchia d'olio, sintomo dell'infezione primaria portata dalla pioggia del 1 maggio. In previsione delle futura pioggia di settimana prossima è utile mantenere la copertura della vegetazione con prodotti ad azione citotropica o a base rameica. Conservare i principi attivi sistemici per le fasi più delicate. Le aziende che hanno già effettuato un trattamento in questa settimana rispettino il periodo di carenza del prodotto utilizzato.

Oidio. E' da prediligere l'utilizzo di un principio attivo di pari persistenza, ricordando di non effettuare più di 3 trattamenti con lo stesso prodotto. Controllare le dosi realmente impiegate.

Avversità	Principio attivo	Nome Commerciale	Dose/ettaro	Note
PERONOSPORA	Rame	Poltiglia Disperss	3 Kg	Dilavati da piogge >35 mm
		Kocide 3000	2,5 Kg	
		Cuprosar WDG, Cuprozin	1,5 Kg	
	Dimethomorf , Iprovalicarb	Forum R3B, Quasar R	3 Kg	Resiste al dilavamento
OIDIO	Metrafenone	Vivando	0,2 litri	In miscela con antiperonosporico
	Spiroxamina	Prosper	0,7 litri	
	Zolfo Bagnabile	es. Tiovit o vari	3-4 Kg	

Varie.

- Nei vigneti in cui si nota la carenza di potassio è consigliato l'utilizzo di concimi fogliari. Nel caso in cui ci fosse la presenza di altre carenze contattare il tecnico.
- Si consiglia di palizzare i germogli più lunghi, avendo cura di non cimare il germoglio.
- Portare a termine i lavori di scacchiatura e spollonatura.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610