



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 5/2012 del 29/05/2012

Fase fenologica. nelle varietà precoci (Pinot nero e Chardonnay) è possibile notare la fase di fioritura. I vitigni a maturazione tardiva (Croatina e Barbera) sono in prefioritura e solo in certe zone si nota un inizio di fioritura.

Peronospora. In questa fase fenologica delicata si consiglia di mantenere una buona copertura con principi attivi sistemici specialmente nei vigneti in piena fioritura. Le aziende che hanno già effettuato un trattamento ad azione sistemica rispettino il periodo di carenza del prodotto utilizzato. Chi intraprende una strategia di difesa biologica, si consiglia di mantenere la copertura a 5-7 giorni trattando tutti i filari.

Oidio. E' da prediligere l'utilizzo di un principio attivo di pari persistenza, ricordando di non effettuare più di 3 trattamenti con lo stesso prodotto.

Avversità	Principio attivo	Prodotto commerciale	Dose/ettaro	Note
PERONOSPORA	Rame	Kocide 3000 (15%) Poltiglia Bord.Disperss Cuprosar WDG, Cuprozin	3 Kg 3,5 Kg 1,75 Kg	Dilavati da piogge > <u>35</u> <u>mm</u> Prodotti Sistemici
	Ciazofamide	Mildicut	4 Kg	
	Fluopicolide + Fosetil-Al	R6 Albis	2,5 Kg	
	Mandipropamid + Rame	Pergado combi pack	0,5 litri + 2 Kg	
OIDIO	Metrafenone	Vivando	0,25 litri	
	Penconazolo	Topas	0,25 litri	
	Zolfo bagnabile	Vari	3-4 Kg	

Varie.

- Nei vigneti in cui si nota la carenza di potassio è consigliato l'utilizzo di concimi fogliari. Nel caso in cui ci fosse la presenza di altre carenze contattare il tecnico.
- Si ricorda di trattare tutti i filari.
- Si consiglia di palizzare i germogli più lunghi, avendo cura di non cimare il germoglio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610