



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 1/2014 del 16/04/2014

Fase fenologica. La settimana appena trascorsa ha segnato un rialzo delle temperature massime e minime consentendo al germoglio di svilupparsi omogeneamente in tutte le zone. Nelle esposizioni più favorevoli si raggiungono i 20-30 cm di germoglio, ma in altre situazioni lo sviluppo si è attestato attorno ai 5-10 cm. E' previsto un abbassamento delle temperature massime che potrebbero rallentare l'accrescimento vegetativo.

Oidio. Nei vigneti interessati da forti attacchi di oidio durante la scorsa stagione o nelle zone a forte rischio e in abbinamento a varietà sensibili, si raccomanda di eseguire un trattamento con Zolfo in polvere in polvere a 25 kg/ha oppure con Zolfo bagnabile aumentando il dosaggio. È utile trattare con questo principio attivo anche per combattere eventuali attacchi di escoriosi sul germoglio in accrescimento.

Peronospora. Le condizioni di tempo stabile nelle ultime due decadi non hanno permesso un attacco di questo fungo, tuttalpiù le piogge previste per il fine settimana sono da considerarsi preparatorie. In base a queste considerazioni, si consiglia di controllare le previsioni meteo ed eventualmente valutare l'ipotesi di intervenire con un trattamento di copertura (non citotropico) in particolar modo nelle aziende che intendono attuare una linea di lotta biologica. Per eventuali dubbi contattare il tecnico.

Varie.

- Si consiglia di effettuare la manutenzione ordinaria sulle attrezzature per l'irrorazione dei trattamenti fitosanitari in vista della nuova stagione (pulizia ugelli e filtri, ecc.)
- In questo periodo è opportuno effettuare la messa a dimora delle barbatelle nei nuovi impianti e all'interno dei vigneti in produzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel. 3403053610