



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 1/2016 del 23/04/2016

Fase fenologica. Tempo stabile e temperature medie anche al di sopra nelle medie stagionali hanno favorito un buon sviluppo dei germogli in tutte le zone. Nelle esposizioni più favorevoli hanno raggiunto i 20-30 cm di sviluppo. E' previsto un abbassamento delle temperature massime che potrebbero rallentare l'accrescimento vegetativo.

Peronospora. Le condizioni di tempo stabile delle ultime due settimane non sono risultate favorevoli per lo sviluppo di questo fungo; le piogge previste per il fine settimana, se abbondanti, sono da considerarsi preparatorie. Si consiglia di controllare le previsioni meteo della prossima settimana; è previsto tempo poco stabile, per tanto valutare l'ipotesi di intervenire con un trattamento di copertura (non citotropico) in particolar modo nelle aziende che intendono attuare una linea di lotta biologica.

Oidio. Nei vigneti interessati da forti attacchi di oidio durante la scorsa stagione o nelle zone a forte rischio o varietà sensibili, si raccomanda di eseguire un trattamento con Zolfo in polvere a 25 kg/ha oppure con Zolfo bagnabile a dose massima. E' utile trattare con questo principio attivo anche per combattere eventuali attacchi di escoriosi sul germoglio in accrescimento.

Varie.

- Si consiglia di effettuare la manutenzione ordinaria sulle attrezzature per l'irrorazione dei trattamenti fitosanitari in vista della nuova stagione (pulizia ugelli e filtri, ecc.)
- Si ricorda, secondo le nuove disposizioni che vanno in vigore da quest'anno, che i viticoltori, che fanno la denuncia di produzione delle uve e del vino, sono tenuti ad avere il patentino per l'acquisto e l'uso dei fitofarmaci, di segnare sul quaderno di campagna ogni trattamento effettuato seguendo le disposizioni del d.l. n°150 del 14/08/2012.