



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 3/2014 del 02/05/2014

Fase fenologica. Il germoglio, grazie alla presenza di tempo stabile della settimana scorsa, ha raggiunto in tutte le zone la lunghezza minima di 20-25 cm, mentre nelle zone ben esposte si superano i 40 cm. Si può notare l'allungamento del grappolo e in alcune zone ben esposte inizia la separazione dei bottoni fiorali.

Peronospora. Attualmente la zona è interessata da instabilità meteorologica la quale potrebbe portare nelle seguenti giornate dei rovesci a carattere temporalesco. Con la pioggia di lunedì 28 di circa 30 mm e di martedì 30, esistono le condizioni per l'avvio di una infezione primaria. si raccomanda di ripristinare la copertura con un prodotto ad azione **citotropica** appena si ristabilizzano le condizioni meteorologiche. Questi prodotti esigono una permanenza di almeno 2-3 ore sulla pianta per esplicare la loro funzione endoterapica. Le aziende a conduzione biologica effettuino un trattamento di copertura con rame appena è possibile entrare nei vigneti. È importante rispettare e controllare le dosi riportate in etichetta e successivamente impiegate ad ettaro, nonché osservare la giusta distribuzione del fitofarmaco sulla vegetazione.

Oidio. Con il ristabilirsi delle condizioni meteo è consigliato di mantenere una copertura anche verso questa avversità, quindi aggiungere in miscela un P.A di pari persistenza al trattamento antiperonosporico.

Varie.

- Proseguire i lavori di scacchiatura e spollonatura.
- Effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta da P.A antiperonosporici.
- Portare a termine i lavori di riposizionamento delle barbatelle mancanti all'interno dei vigneti in produzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610