



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 3/2015 del 07/05/2015

**Fase fenologica.** Dopo il passaggio della perturbazione atlantica che ha interessato il territorio nei giorni 25-29 aprile, le temperature medie hanno fatto registrare un graduale aumento sino a portarsi da 14°C a 21°C. Dal 30 aprile non si sono registrate precipitazioni.

Il germoglio, grazie alla presenza di tempo stabile, ha raggiunto in tutte le zone la lunghezza minima di 20-25 cm, mentre nelle zone ben esposte si superano i 40 cm. Si può notare l'allungamento del grappolo e in alcune zone ben esposte sta iniziando la separazione dei bottoni fiorali.

**Peronospora.** Le attuali condizioni non sono favorevoli allo sviluppo di infezioni. Viste le previsioni di tempo instabile per i prossimi giorni, si consiglia di ripristinare la copertura privilegiando l'impiego di principi attivi preventivi, di copertura, allo scadere del turno del trattamento precedente ed avendo cura di anticipare eventuali piogge infettanti, attualmente previste nella giornata di venerdì 8 maggio.

Le aziende a conduzione biologica effettuino un trattamento di copertura con rame, allo scadere del turno del trattamento precedente (6-7 gg.).

Rischio infezione: basso.

**Oidio.** Le precipitazioni previste per i prossimi giorni possono promuovere infezioni ascosporiche. Si consiglia di aggiungere zolfo bagnabile alla miscela.

### Varie.

- Proseguire i lavori di scacchiatura e spollonatura.
- Effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta da P.A antiperonosporici.
- Portare a termine i lavori di riposizionamento delle barbatelle mancanti all'interno dei vigneti in produzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596