



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 8/2011 del 09/06/2011

**Fase fenologica.** Nelle varietà precoci come il Pinot nero e Chardonnay si è raggiunta la fase di pre-chiusura grappolo; la stessa situazione nei versanti ben esposti la si può constatare nella Barbera. Le varietà tardive come la Croatina ha concluso l'allegagione e l'acino si appresta a superare la dimensione del grano di pepe, fase in cui si riduce il rischio di attacco della peronospora sul grappolo.

**Peronospora.** Le abbondanti piogge dell'ultima settimana hanno di sicuro avviato l'infezione primaria da parte di questo fungo. Appena si conclude questo periodo caratterizzato da forti piogge si consiglia di trattare con principi attivi sistemici solo le varietà in cui non si è raggiunto il grano di pepe; nelle varietà in cui si è già in pre-chiusura (varietà precoci) è necessario mantenere anche una copertura con prodotti citotropici, meglio se in miscela con rame per avere una discreta prevenzione contro la botrite. In caso di dubbio contattare il tecnico.

**Oidio.** Le condizioni atmosferiche attuali non permettono la proliferazione di questa malattia, ma il rialzo previsto delle temperature medie con i livelli elevati di umidità creano la situazione ottimale per l'attività dell'oidio. Quindi si consiglia di miscelare un prodotto sistemico (non lo stesso per più di 3 volte all'anno) oppure zolfo bagnabile a dosi di 3-4 kg/ha.

**Botrite.** le continue piogge possono favorire l'attività di questa malattia in particolar modo nelle zone di fondovalle e nelle varietà sensibili a grappolo chiuso (Pinot, Chardonnay, Riesling). Effettuare una leggera sfogliatura in entrambi i lati del filare ostacola l'eventuale attacco di questo fungo e inoltre aumenta l'efficienza del trattamento. In caso di dubbio o per l'utilizzo di principi attivi contattare il tecnico.

**Flavescenza dorata.** Dal 10 al 19 giugno è obbligatorio effettuare il primo trattamento contro il vettore di questa malattia, lo Scaphoideus Titanus. Nella prima parte di questo periodo è consigliato l'utilizzo di regolatori di crescita, mentre a seguire sarà necessario l'uso di soli prodotti abbattenti.

Avversità	Principio attivo	Prodotto commerciale	Dose/ettaro	Note
Peronospora	Ciazofamide	Mildicut	3,5 kg	Prodotti Sistemici
	Fluopicolide + Fosetil-Al	R6 Albis	2,5 kg	
	Mandipropamid + Rame	Pergado combi pack	0,5 litri + 2 kg	
	Dimetomorf	Forum R	3,5 kg	
Oidio	Metrafenone	Vivando	0,25 litri	
	Spiroxamina	Prosper	1 litro	
	Zolfo bagnabile	es. Tiovit, Kumulus	3-4 kg	
Cicalina della Flavescenza Dorata 1° trattamento obl. dal 10/06 al 19/06	Clorpirifos etile o metile	Metidane, Reldan, Cleaner, Rifos CS, Etifos, Pirinex pronto	Varie	Efficace per forme adulte
	Flufenoxurom	Cascade	2 kg	Efficace per forme giovanili
	Tiametoxam	Actara	0,2 kg	Sistemico

**Varie.**

- Si consiglia di palizzare i germogli
- È possibile attuare la cimatura dei germogli mantenendo almeno 8-10 foglie al di sopra dell'ultimo grappolo.
- Si ricorda in questo periodo di rispettare i tempi di carenza dei principi attivi.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610**

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano  
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE