



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 10/2012 del 10/07/2012

**Fase fenologica.** Attualmente le varietà a grappolo compatto hanno completato la chiusura del grappolo in tutte le zone della collina.

**Oidio.** Con la situazione attuale climatica di tempo stabile c'è un basso rischio di attacco da parte di questo fungo. Comunque è utile mantenere una copertura con prodotti di copertura come lo zolfo bagnabile, ricordandosi di non adottare dosi ad ettaro troppo basse (3-4 kg/ha). Si consiglia solo l'utilizzo di zolfo in polvere nei vigneti in cui si ha in corso un attacco di oidio, trattando alla mattina presto o alla sera tardi, evitando le ore più calde della giornata.

**Peronospora.** I livelli bassi di umidità relativa e la scarsa presenza di persistenti bagnature fogliari, ostacolano il proliferarsi di infezioni. È utile mantenere una copertura con prodotti rameici per proteggere la nuova vegetazione, rispettando un tempo di carenza di 8 giorni in base alla condizione atmosferica.

**Flavescenza Dorata.** In questo periodo è possibile attuare il secondo trattamento obbligatorio verso il vettore della Flavescenza dorata. Quindi aggiungere in miscela il P.A. insetticida trattando con un volume di acqua non inferiore a 300-400 litri ad ettaro. Si ricorda di distanziare i due trattamenti a 20 giorni circa.

**Tignola.** Sulla collina è in corso il monitoraggio verso questo insetto. Al momento è in corso il volo della seconda generazione. Con il trattamento insetticida contro lo *Scaphoideus Titanus* è possibile contrastare in parte l'attività della tignola. Si consiglia di osservare i seguenti bollettini per ulteriori informazioni e contattare il tecnico in caso di dubbio.

**Botrite.** In questa fase fenologica e in abbinamento a questo trattamento insetticida, l'azienda che intende proteggersi da eventuali attacchi può aggiungere in miscela un P.A. anti botritico.

Avversità	Principio attivo	Prodotto commerciale	Dose/ettaro	Note
Peronospora	Rame	Cuprozin	1,75 kg	
		Kocide 3000	3 kg	
		Poltiglia Bord. Disperss	4 kg	
Oidio	Zolfo in polvere	Vari	30 kg	In caso di forte attacco
	Zolfo bagnabile	es. Tiovit, Kumulus	3-4 kg	
Cicalina della Flavescenza Dorata 2° trattamento obbl. dal 28/06 al 14/07	Clorpirifos etile o metile	Metidane, Reldan, Cleaner, Rifos CS, Etifos, Pirinex pronto	Varie	Efficace per forme adulte
	Tiametoxam	Actara	0,2 kg	Sistemico

### Varie.

- Per informazioni o consigli sulle sfogliature contattare il tecnico.
- È possibile attuare la cimatura dei germogli mantenendo almeno 8-10 foglie al di sopra dell'ultimo grappolo.
- Attenzione a non esporre troppo i grappoli sul lato irradiato dal sole nelle ore più calde.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610**

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano  
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE