



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 9/2012 del 29/06/2012

Fase fenologica. Attualmente le varietà precoci come Pinot nero, Chardonnay e Riesling hanno completato la chiusura del grappolo, mentre le varietà tardive a grappolo compatto sono in pre chiusura.

Oidio. Con la situazione attuale climatica, è necessario mantenere un buon livello di protezione, in particolar modo nelle zone sensibili all'attacco di questa malattia. Si consiglia per tanto l'utilizzo di zolfo in polvere specialmente nei vigneti in cui si ha in corso un attacco di oidio, trattando alla mattina presto o alla sera tardi, evitando le ore più calde della giornata. Nei casi di assenza di malattia o di presenza limitata, si consiglia di utilizzare zolfo bagnabile, ricordandosi di non adottare dosi ad ettaro troppo basse (3-4 kg/ha).

Peronospora. Dopo il periodo ricco di precipitazioni della prima decade di giugno, sono comparse solo in alcuni vigneti le prime macchie d'olio, sintomo di infezione di questo fungo. In queste situazioni mantenere una copertura con prodotti rameici è sufficiente per contrastare l'attività della malattia. Con le condizioni attuali di rischio, si giustifica l'utilizzo di principi attivi sistemici solo in caso di gravi infezioni.

Flavescenza Dorata. In questo periodo è possibile attuare il secondo trattamento obbligatorio verso il vettore della Flavescenza dorata. Quindi aggiungere in miscela il P.A. insetticida trattando con un volume di acqua non inferiore a 300-400 litri ad ettaro. Si ricorda di distanziare i due trattamenti a 20 giorni circa.

Tignola. Sulla collina è in corso il monitoraggio verso questo insetto. Al momento è in corso il volo della seconda generazione. Con il trattamento insetticida contro lo Scaphoideus Titanus è possibile contrastare in parte l'attività della tignola. Si consiglia di osservare i seguenti bollettini per ulteriori informazioni e contattare il tecnico in caso di dubbio.

Botrite. In questa fase fenologica e in abbinamento a questo trattamento insetticida, l'azienda che intende proteggersi da eventuali attacchi può aggiungere in miscela un P.A. anti botritico.

Avversità	Principio attivo	Prodotto commerciale	Dose/ettaro	Note
Peronospora	Rame	Cuprozin	1,75 kg	
		Kocide 3000	3 kg	
		Poltiglia Bord. Disperss	4 kg	
Oidio	Zolfo in polvere	Vari	30 kg	In caso di forte attacco
	Zolfo bagnabile	es. Tiovit, Kumulus	3-4 kg	
Cicalina della Flavescenza Dorata 2° trattamento obl. dal 28/06 al 14/07	Clorpirifos etile o metile	Metidane, Reldan, Cleaner, Rifos CS, Etifos, Pirinex pronto	Varie	Efficace per forme adulte
	Tiametoxam	Actara	0,2 kg	Sistemico

Varie.

- Per informazioni o consigli sulle sfogliature contattare il tecnico.
- È possibile attuare la cimatura dei germogli mantenendo almeno 8-10 foglie al di sopra dell'ultimo grappolo.
- Attenzione a non esporre troppo i grappoli sul lato irradiato dal sole nelle ore più calde.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE