



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 3/2016 del 12/05/2016

**Fase fenologica.** I germogli, grazie alla presenza di tempo stabile della settimana scorsa, hanno continuato il loro sviluppo e nelle zone ben esposte hanno superato i 40 cm. Si può notare l'allungamento del grappolo e l'inizio della separazione dei bottoni fiorali. Il tempo instabile di questa settimana con un certo rallentamento dello sviluppo potrebbe compromettere la completa formazione del grappolo soprattutto sulle varietà meno sviluppate, di quarta epoca, come la croatina.

**Peronospora.** Questa settimana la zona è interessata da instabilità meteorologica, con precipitazioni, circa 20-25 mm il giorno 11 e poco più di 10 mm il giorno 12. Esistono quindi le condizioni per l'avvio di una infezione primaria. Appena si stabilizzano le condizioni meteorologiche, si consiglia di effettuare un trattamento con prodotto di copertura in miscela con p.a. **citotropici** (*cimoxanil, dimetomorf ....*) o **sistemici** (*metalaxil, benalaxil, fosetilal ....*). In situazioni di tempo instabile con rischio pioggia, è consigliabile intervenire alla scadenza dell'intervallo minimo consigliato per i principi attivi utilizzati.

Le aziende a conduzione biologica effettuino un trattamento di copertura con rame appena è possibile entrare nei vigneti.

**Oidio.** Con il ristabilirsi delle condizioni meteo è consigliato di mantenere una copertura anche verso questa avversità, quindi aggiungere in miscela un P.A di pari persistenza al trattamento antiperonosporico.

### Varie.

- E' importante rispettare e controllare le dosi riportate in etichetta e successivamente impiegate ad ettaro, nonché osservare la giusta distribuzione del fitofarmaco sulla vegetazione.
- Proseguire i lavori di scacchiatura e spollonatura.
- Effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta da P.A antiperonosporici.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596