



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 3/2013 del 11/05/2013

**Fase fenologica.** Il germoglio ha raggiunto in tutte le zone la lunghezza minima di 20-25 cm, mentre nelle zone ben esposte si superano i 40 cm. Si può notare l'allungamento del grappolo e in alcune zone ben esposte inizia la separazione dei bottoni fiorali.

**Peronospora.** Attualmente la zona è interessata da instabilità meteorologica la quale potrebbe portare nelle seguenti giornate dei rovesci a carattere temporalesco. Dopo la pioggia di domenica 5 di circa 20-30 mm e un fenomeno non rilevante di martedì 7, si raccomanda di ripristinare la copertura con un prodotto ad azione citotropica in previsione delle future piogge dalla metà di settimana prossima. Si ricorda che questi prodotti esigono una permanenza di almeno 2-3 ore sulla pianta per esplicare la loro funzione. Per le aziende a conduzione biologica si ricorda di ripristinare la copertura con rame non appena possibile entrare nei vigneti. Le aziende che hanno già effettuato un trattamento in questa settimana rispettino il periodo di carenza del prodotto utilizzato.

**Oidio.** E' da prediligere l'utilizzo di un principio attivo di pari persistenza, ricordando di non effettuare più di 3 trattamenti con lo stesso prodotto. Controllare le dosi realmente impiegate.

Avversità	Principio attivo	Nome Commerciale	Dose/ettaro	Note
PERONOSPORA	Rame	Poltiglia Disperss	3 Kg	Dilavati da piogge >35 mm
		Kocide 3000	2,5 Kg	
		Cuprosar WDG, Cuprozin	2 Kg	
	Dimethomorf , Iprovalicarb	Forum R3B, Quasar R	3 Kg	Resiste al dilavamento
OIDIO	Metrafenone	Vivando	0,2-0.25 litri	In miscela con antiperonosporico
	Spiroxamina	Prosper	1 litri	
	Zolfo Bagnabile	es.Tiovit o vari	3-4 Kg	

### Varie.

- Portare a termine i lavori di scacchiatura e spollonatura appena possibile.
- Effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610