



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 4/2018 del 22/05/2018

Fase fenologica. Anche nelle condizioni di tempo instabile con temperature medie al di sotto della media stagionale, i germogli di tutte le varietà hanno continuato a svilupparsi. In zone ben esposte è iniziata la fioritura non solo per le varietà precoci come Chardonnay e Pinot nero, ma anche per Verdea, Merlot e Barbera.

Peronospora. Il continuo alternarsi di sole e piogge, anche di pochi millimetri, accompagnate da prolungate bagnature notturne, hanno favorito lo sviluppo della malattia; anche nei vigneti trattati si sono trovate macchie d'olio sporulate e grappolini colpiti dalla peronospora. Allo scadere del turno del trattamento precedente, è importante ripristinare tempestivamente la copertura. Considerata la fase fenologica delicata e la prolungata fase di instabilità meteorologica si consiglia di ripristinare la copertura con prodotti ad azione sistemica (*Metalaxil, Benalaxil, Fosetil Al ...*) in modo da proteggere il più possibile il grappolo e la vegetazione in rapida crescita. In presenza di sintomi della malattia è opportuno usare p.a. con funzione eradicante come *dimetomorf e mandipropamid*. Si raccomanda di usare le dosi massime ettaro consigliate in etichetta e di trattare con volumi d'acqua non inferiori a 300 litri/ettaro.

Oidio. E' da prediligere l'utilizzo di un principio attivo di pari persistenza a quello antiperonosporico (*ibe, spiroxamina, penconazolo....*), ricordando di non effettuare più di 3 trattamenti all'anno con prodotti che hanno lo stesso principio attivo, e di alternare p.a. caratterizzati da differente famiglia chimica e meccanismo d'azione. Controllare le dosi realmente impiegate.

Tignoletta. Sono comparse le prime larve della tignoletta della prima generazione, che ha avuto un volo disturbato dall'instabilità meteorologica.

Varie.

- Nei vigneti in cui si nota la carenza di potassio o di scarso sviluppo dei germogli è consigliato l'utilizzo di concimi fogliari.
- Effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta da p.a. antiperonosporici.
- Si consiglia di palizzare i germogli più lunghi, avendo cura di non cimare il germoglio.
- **Si consiglia di trinciare l'erba dei terreni incolti e delle rive vicini a vigneti in produzione entro la fine di maggio per evitare di spostare eventuali insetti nocivi alla vite, dall'incolto al vigneto.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596