



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 5/2013 del 28/05/2013

Fase fenologica. L'abbassamento drastico delle temperature ha rallentato lo sviluppo del germoglio in tutte le varietà, che hanno raggiunto la fase di pre fioritura. In zone ben esposte alla radiazione solare si nota un timido inizio di fioritura ma solo per le varietà precoci. Con la ripresa delle temperature si aspetta una ripresa di crescita da parte del germoglio.

Peronospora. Sono comparsi durante l'ultima settimana attacchi di peronospora su grappolo in particolar modo su barbera e Croatina in molte zone della collina, accompagnati da macchie d'olio sparse sulla vegetazione. Essendo la fase fenologica delicata e in abbinamento alle abbondanti precipitazioni del fine settimana, si consiglia alle aziende in cui termina il periodo di carenza del P.A. (6-8 giorni in caso di P.A. citotropici) di ripristinare la copertura con prodotti ad azione sistemica in modo da proteggere il più possibile il grappolo. Si raccomanda di rispettare le dosi in etichetta e di trattare tutti i filari, in particolar modo nei vigneti colpiti.

Oidio. Con le temperature attuali non ci sono particolari rischi di attacco da parte di questa avversità. Dovendo intervenire più spesso per contrastare la peronospora, si consiglia di aggiungere in miscela zolfo bagnabile a 3-4 kg ad ettaro, in modo da mantenere la copertura. L'azienda che intende aggiungere in miscela prodotti sistemici si consiglia di non usare per più di 3 volte lo stesso P.A.

Avversità	Principio attivo	Prodotto commerciale	Dose/ettaro	Note
PERONOSPORA	Rame	Kocide 3000 (15%) Poltiglia Bord.Disperss Cuprosar WDG, Cuprozin	3 Kg 3,5 Kg 1,75 Kg	Dilavati da piogge > <u>35</u> <u>mm</u> Prodotti Sistemici
	Ciazofamide	Mildicut	4 Kg	
	Fluopicolide + Fosetil-Al	R6 Albis	2,5 Kg	
	Mandipropamid + Rame	Pergado combi pack	0,5 litri + 2 Kg	
OIDIO	Metrafenone	Vivando	0,25 litri	
	Penconazolo	Topas	0,25 litri	
	Zolfo bagnabile	Vari	3-4 Kg	

Varie.

- Nei vigneti in cui si nota la carenza di potassio è consigliato l'utilizzo di concimi fogliari.
- Si consiglia di palizzare i germogli più lunghi, avendo cura di non cimare il germoglio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE