



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 9/2015 del 01/07/2015

Fase fenologica. In tutte le varietà si è raggiunta la fase di chiusura grappolo.

Peronospora. Le attività di monitoraggio in campo confermano la presenza di macchie d'olio sporulate anche nei vigneti adeguatamente trattati, segno della presenza di un inoculo non trascurabile, la cui aggressività è partita, molto probabilmente dalla pioggia di martedì 23 giugno. In previsione di giorni meteorologicamente stabili si consiglia di trattare con principi attivi di copertura nei vigneti dove non c'è presenza di malattia. Alla presenza di sintomi della malattia e con condizioni di forti rugiade mattutine nelle zone più umide, aggiungere in miscela prodotti citotropici o p.a. caratterizzati da spiccata affinità con le cere in grado di proteggere meglio la vegetazione e i grappoli. In caso di dubbio contattare il tecnico.

Oidio. Il rialzo previsto delle temperature medie con i livelli elevati di umidità creano la situazione ottimale per l'attività dell'oidio. Quindi si consiglia di miscelare un prodotto sistemico (non lo stesso per più di 3 volte all'anno) con un prodotto di copertura zolfo bagnabile a 2-4 kg/ha. E' possibile intervallare un trattamento con zolfo in polvere a 25 kg/ettaro specialmente nei vigneti che sono a forte rischio di attacco. In caso di accertata presenza di infezioni in atto è consigliabile privilegiare l'impiego di prodotti a base di meptyl dinocap o spiroxamina.

Botrite. Le piogge o gli eccessi di umidità possono favorire l'attività di questa malattia in particolar modo nelle zone di fondovalle e nelle varietà sensibili a grappolo chiuso (Pinot, Chardonnay, Riesling, Barbera). Effettuare una leggera sfogliatura sul lato del filare meno esposto al sole, ostacola l'eventuale attacco di questo fungo e inoltre aumenta l'efficienza dei trattamenti. In caso di dubbio o per l'utilizzo di principi attivi contattare il tecnico.

Tignoletta. Nella zona il monitoraggio ha mostrato una presenza dell'insetto non molto elevata. Il volo iniziato la prima decade di giugno, al momento è in esaurimento; si consiglia di monitorare attentamente la situazione in campo (es. presenza di uova, larve) soprattutto i vigneti con varietà sensibili e che storicamente abbiano segnalato la presenza delle larve sui grappoli nelle annate precedenti. Il secondo abbattente per la flavescenza dorata più limitare la presenza di questa larva. Per ulteriori informazioni contattare il tecnico.

Scaphoideus titanus Si rende noto che con Comunicato del 03.06.2015, il SFR ha stabilito i periodi per l'esecuzione dei 2 trattamenti obbligatori per il controllo di *Scaphoideus titanus* sul nostro territorio: I° trattamento dal 8 giugno al 20 giugno, II° trattamento dal 20 giugno al 5 luglio.

Varie.

- Si raccomanda di eseguire la trinciatura delle erbe infestanti prima di procedere all'esecuzione dei trattamenti insetticidi volti al controllo delle popolazioni di *Scaphoideus titanus*, allo scopo di salvaguardare gli insetti pronubi, utili.
- E' possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati, al Servizio Agricoltura-Parco del Comune indicando foglio-mappale del vigneto in questione (Luigi Geom. Fedeli telef. 0371-293222, mail agricoltura@comune.sancolombanoallambro.mi.it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano e la Società Cooperativa CO.PRO.VI. di Casteggio (Pv)

LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E' COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE