



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 9/2019 del 27/06/2019

**Fase fenologica.** Tutte le varietà hanno concluso la fase di fioritura; siamo nella fase di ingrossamento acini con chiusura dei grappoli, soprattutto per le qualità precoci e la Barbera; per alcune qualità l'allegagione appare irregolare con una elevata colatura. E' previsto tempo stabile fino a metà settimana prossima, con temperature medie elevate, 25°, 26°, e massime di qualche grado superiori ai 30°.

**Peronospora.** Le attuali condizioni climatiche non sono favorevoli all'instaurarsi di nuove infezioni. Prestare sempre la **massima attenzione**, vista la fase fenologica e la presenza di alcune macchie talvolta sporulate, e qualche grappolo colpiti da peronospora larvata, compatibili con le piogge altamente infettanti verificatesi gli ultimi giorni di maggio e la bagnatura fogliare di sabato mattina e della notte. Si consiglia di ripristinare la protezione, se è in scadenza il turno precedente, privilegiando l'impiego di p.a. caratterizzati da spiccata affinità con le cere dell'acino (*ametoctradina*, *amisulbrom*, *cyazofamid*, *famoxadone*, *fenamidone*, *fluopicolide*, *mandipropamide*, *zoxamide*) e pertanto in grado di garantirne un'adeguata protezione del grappolo.

**Oidio.** Considerata la fase fenologica di estrema suscettibilità, le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del fungo e la presenza di infezioni si raccomanda di ripristinare la copertura allo scadere del turno privilegiando l'impiego di principi attivi caratterizzati da spiccata affinità con le cere dell'acino e/o capacità di redistribuzione in fase di vapore (per ex. *boscalid*, *cyflufenamid*, *fluxapyroxad*, *proquinazid*, *trifloxystrobin*) avendo cura di alternare p.a. caratterizzati da differente meccanismo d'azione. Nella fase fenologica di fine fioritura è inoltre indicato un trattamento a base di zolfo in polvere specialmente nei vigneti ad alto rischio, avendo cura di evitare la distribuzione nelle ore più calde della giornata.

**Tignoletta dell'uva.** E' iniziato il volo della seconda generazione della tignoletta con catture settimanali interessanti: zona Corà 30, Capra 60, Valbissera 105.

**Botrite.** Alcune varietà sono nella fase di chiusura grappolo; si consiglia un trattamento specifico su quelle sensibili alla muffa grigia, avendo cura di garantire un'adeguata bagnatura del grappolo, favorita da idonee pratiche di gestione della chioma.

### Varie.

- Il Servizio Fitosanitario Regionale ha comunicato le date per **i due trattamenti obbligatori contro la scafoideo vettore della Flavescenza Dorata della vite**: il primo dal 17 al 30 giugno, il secondo dal 10 al 21 luglio. Si consiglia di conservare gli scontrini o le fatture di acquisto dei prodotti usati per i trattamenti obbligatori contro lo scafoideo per non avere problemi in caso di controlli.
- Portare a termine la palizzatura dei germogli, iniziare la cimatura e una leggera defogliatura sui lati del filare meno esposti al sole. Una corretta esecuzione di tali pratiche di gestione del verde favorisce l'arieggiamento e l'idonea distribuzione e penetrazione dei prodotti fitosanitari.
- Con l'aumentare della vegetazione, si consiglia di trattare tutti i filari e di impiegare volumi d'acqua non inferiori a 300 litri/ettaro.
- **Si raccomanda di eseguire la trinciatura delle erbe infestanti prima di procedere all'esecuzione dei trattamenti insetticidi volti al controllo delle popolazioni di *Scaphoideus titanus*, allo scopo di salvaguardare gli insetti pronubi, utili.**
- **E' possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati al Servizio Agricoltura-Parco del Comune di San Colombano indicando foglio-mappale e proprietario del terreno**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596

Federico cel. 338 5828793